

PARA SUPREP SE NECESITA UNA RECETA QUE SE INCLUYE EN ESTE PAQUETE. LLEVE LA RECETA A LA FARMACIA CON ANTICIPACIÓN, YA QUE ALGUNOS SEGUROS EXIGEN UNA AUTORIZACIÓN PREVIA. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES, NO LAS QUE VIENEN EN EL ENVASE QUE RECIBE DE LA FARMACIA.

Recordatorios

- **Transporte:** Debido a que usted recibirá sedantes, una persona mayor de 18 años de edad **DEBE** llevarlo a la consulta, permanecer en la sala de espera durante todo el procedimiento y conducirlo posteriormente a su casa. Los taxis o autobuses **NO** son un medio de transporte aceptable. **Si no hace arreglos para trasladarse en un medio de transporte adecuado, es posible que su procedimiento deba reprogramarse para otro momento.**
- Para que el procedimiento pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria, es esencial realizar una limpieza exhaustiva. Siga detalladamente estas instrucciones, ya que **si no realiza correctamente la preparación, es posible que su procedimiento deba reprogramarse para otro momento.**
- Contacte nuestra oficina al **(336) 448- 2427 (presione 0)** si tiene preguntas sobre su preparación o si se producen cambios en su historial médico entre el día en que programó la cita y el día de la cita.
- Requerimos un aviso de dos días hábiles si hay una necesidad de cambio o cancelación de su procedimiento.
- Por favor deje todas las joyas y objetos de valor en la casa, ya que no proporcionamos un lugar seguro para dichos objetos.

Medicamentos

- Tome todos los medicamentos necesarios al menos **4 horas antes** de su hora de llegada.
- **Diabetes:** Contacte el médico que le provee las recetas en cuanto a las instrucciones sobre cómo tomar los medicamentos inyectables para la diabetes el día anterior al procedimiento y el día del procedimiento. **NO TOME** medicamentos orales para la diabetes el día del procedimiento.
- **Presión arterial:** **NO OMITA** ninguna dosis de su medicamento para la presión arterial.
- **Hierro:** **PARE** de tomar hierro 5 días antes del procedimiento.
- **Inhaladores y nebulizadores:** Pueden usarse hasta la hora del procedimiento.
- **Anticoagulantes:** Por favor contacte el médico que le provee la receta para asegurarse si esta bien parar esos medicamentos por los días recomendados antes del procedimiento. Si toma un anticoagulante que no figura en la lista a continuación, por favor contacte al médico que le provee las recetas para las instrucciones. Puede seguir tomando aspirina, a menos que se le indique lo contrario.

| | | | | | |
|---------|---------------|--------------------------------|--------|-------------------|------------|
| Xarelto | 24 a 48 horas | Pletal / Persantine | 2 días | Aggrenox / Plavix | 5 a 7 días |
| Eliquis | 48 horas | Brilinta / Coumadin / Jantoven | 5 días | Effient | 7 días |

2 Días antes del procedimiento


- ✓ Coma una dieta bien-balanceada. Evite nueces, semillas, palomitas de maíz, frutas y vegetales crudos, y ensaladas.

Día antes al procedimiento


- ✓ **Comience la dieta de líquidos claros. NO consuma nada de color rojo O productos lácteos.** Los líquidos claros pueden incluir agua, bebidas gaseosas, café o té sin crema, helados de paleta, caldo/consomé, gelatina, jugo sin pulpa, etc.
- ✓ A las **4:00 p.m.**, complete los pasos 1 al 4 usando **solamente uno** de las botellas de 6 -onzas.



Vierta una botella de 6 onzas de Suprep líquido en el envase de mezcla.



Agregue agua potable fría hasta la línea que indica 16 onzas en el envase y mezcle.



Bébase **TODO** el líquido que contiene el envase.



DEBE tomar dos envases más de 16 onzas de agua durante la próxima hora.

Día del procedimiento

- ✓ Continúe con la dieta de líquidos claros.
- ✓ **6 horas antes de llegar:** Repita los **pasos del 1-4** (mostrados arriba), usando otra botella de 6 onzas de Suprep líquido.
- ✓ **4 horas antes de llegar:** Ya usted debería haber tomado con su último vaso de agua.

ABSOLUTAMENTE NADA POR LA BOCA DESPUES DE ESTE TIEMPO!