



# Recordatorios sobre el procedimiento Endoscopia superior (EGD)

**Fecha de la cita:** \_\_\_\_\_ **Hora de llegada:** \_\_\_\_\_

Debe llegar **45 minutos antes de la hora del procedimiento**. Esto permite hacer el ingreso, revisar su historia médica y hacer una evaluación antes del procedimiento. Tenga en cuenta que puede que nos comuniquemos los días antes del procedimiento, ya que la hora de llegada puede estar sujeta a cambios.

**Siga cuidadosamente todas las instrucciones, ya que no hacer correctamente la preparación puede tener como consecuencia que se re programe su procedimiento.** Comuníquese con nuestro consultorio llamando al **(336) 448-2427 (opción 6, después opción 2)** si tiene preguntas sobre la preparación o si hay algún cambio en su historial médico entre el día de la programación y la fecha de la cita.

- **Transporte:** por la sedación que recibirá, una persona mayor de 18 años de edad DEBE llevarlo a su cita y llevarlo a su casa después. Los taxis, autobuses, Uber, Lyft o servicios similares **NO** son un medio de transporte aceptable. Si llega sin un conductor, reprogramaremos su procedimiento. Si no sabe si un medio de transporte es aceptable, comuníquese con nuestro consultorio al número que aparece abajo.
- **Consumo de alcohol:** no beba alcohol durante la preparación para su procedimiento.
- **Joyería/objetos valiosos:** no damos un área segura para que guarde dichos artículos.
- **Medicamentos:** tome todos los medicamentos necesarios al menos 4 horas antes de su hora de ingreso.
  - **Medicamentos para la diabetes y para bajar de peso:** deje de tomar los medicamentos de abajo por el período de tiempo recomendado antes de su procedimiento. Para los medicamentos para la diabetes inyectables que no se mencionan abajo, comuníquese con el médico que receta para recibir instrucciones para el día antes y el día del procedimiento. **NO TOME** medicamentos para la diabetes por vía oral el día del procedimiento.

**No tome ninguno de estos el día del procedimiento:**

Adlyxin (Lixisenatide) Diario  
Byetta (Exenatide IR) Diario  
Rybelsus (Semaglutide) Diario  
Saxenda (Liraglutide) Diario  
Victoza (Liraglutide) Diario

**Deje de tomar cualquiera de estos 1 semana antes del procedimiento:**

Bydureon BCise (Exenatide ER) Semanalmente  
Ozempic, Wegovy (Semaglutide) Semanalmente  
Mounjaro Semanalmente  
Trulicity (Dulaglutide) Semanalmente

- **Medicamentos para la presión:** **NO OMITA** ninguna dosis de sus medicamentos para la presión.
- **Inhaladores y nebulizadores:** pueden usarse hasta la hora del procedimiento.
- **Anticoagulantes:** Usando las casillas de verificación de abajo, su proveedor le indicará si se debe ajustar su programa de anticoagulantes. Si está tomando anticoagulantes y no hay ninguna casilla marcada, pregúntele a su proveedor. Si no toma ningún anticoagulante, puede ignorar esta parte.
  - Tome el anticoagulante como de costumbre
  - Deje de tomar el anticoagulante antes del procedimiento (consulte las instrucciones específicas abajo):

Si le recomendaron que deje de tomar el anticoagulante, comuníquese con el médico que le receta este medicamento para asegurarse de que puede dejar de tomarlo durante el tiempo recomendado (que aparece abajo) antes del procedimiento. Puede seguir tomando aspirina, a menos que se le indique lo contrario. Si toma un anticoagulante que no está en la lista, pídale instrucciones al médico que se lo recetó.

**Aggrenox/Plavix:** De 5 a 7 días  
**Arixtra:** 24 horas  
**Brilinta/Coumadin/Jantoven:** 5 días  
**Effient:** 7 días  
**Eliquis:** 48 horas

**Pletal/Persantine:** 48 horas  
**Pradaxa:** 48 horas  
**Savaysa:** De 1 a 3 días  
**Xarelto:** De 24 a 48 horas



## Endoscopía superior (EGD) Instrucciones de preparación para el paciente

### *Instrucciones para su cita:*

- ✓ **24 horas antes del procedimiento:** consuma SOLO líquidos claros. NO PUEDE COMER COMIDAS SÓLIDAS.

Los líquidos claros incluyen agua, refrescos sin alcohol, café o té sin crema, paletas de hielo, caldo/consomé, gelatina, jugo sin pulpa, etc. NO consuma nada de color rojo NI productos lácteos.

- ✓ **4 horas antes de la hora de llegada:**

A PARTIR DE ESTE MOMENTO, ¡NO COMA NI BEBA ABSOLUTAMENTE NADA! (Esto incluye agua).